



ANTIMICROBIANO ORAL PARA CÃES E GATOS

Uso Veterinário

FÓRMULA

Cada comprimido contém:

Doxitabs	50 mg	100 mg	200 mg
Doxiciclina (hclato)	50 mg*	100 mg*	200 mg*
Excipientes q.s.p.	110 mg	220 mg	440 mg

*Valores correspondentes a Doxiciclina base.

DESCRIÇÃO

O Doxitabs é apresentado na forma de comprimidos palatáveis a base de doxiciclina, antimicrobiano da família das tetraciclínas, que atua inibindo a síntese proteica dos microrganismos sensíveis, atuando de forma importante contra bactérias intracelulares. A doxiciclina possui alta solubilidade, penetrando facilmente nos tecidos, podendo ser indicada para diversos tipos de infecções.

INDICAÇÕES

O produto Doxitabs é indicado para o tratamento de infecções de cães e gatos causadas pelos agentes etiológicos listados abaixo, incluindo o tratamento da Erliquiose canina.

Cães: *Ehrlichia canis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus canis*, *Trueperella pyogenes* e *Streptococcus dysgalactiae*.

Gatos: *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus canis*.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

O produto é apresentado na forma de comprimidos palatáveis e deve ser administrado pela via oral. A dose recomendada é de 5 mg de doxiciclina / kg de peso vivo, a cada 12 horas:

1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso vivo.

1 comprimido de 100 mg para cada 20 kg de peso vivo.

1 comprimido de 200 mg para cada 40 kg de peso vivo.

Tabela doses Doxitabs (5mg/kg)

Peso	Doxitabs 50mg	Doxitabs 100mg	Doxitabs 200mg
Até 2,5 kg	1/4 cp.		
2,5 - 5 kg	1/2 cp.	1/4 cp.	
5 - 10 kg	1 cp.	1/2 cp.	1/4 cp.
10 - 20 kg	2 cp.	1 cp	1/2 cp.
20 - 30 kg		1 e 1/2 cp.	3/4 cp.
30 - 40 kg		2 cp.	1 cp.

Recomenda-se que o tratamento seja realizado por 7 dias consecutivos, podendo ser estendido por até 21 dias.

CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÕES DE USO

Deve-se evitar o uso em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.

Deve-se evitar a administração de tetraciclínas em fêmeas prenhas, uma vez que estes antibióticos atravessam a barreira placentária, podendo produzir deformidades ósseas no feto.

Deve ser utilizado com cautela em filhotes, devido ao risco de alterações dentárias com o uso crônico. O produto não foi testado para uso em fêmeas lactantes, prenhas e animais idosos, portanto a segurança de uso nestas categorias não foi avaliada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A absorção das tetraciclínas é reduzida na presença de antiácidos contendo alumínio, cálcio ou magnésio e de preparações contendo ferro e sais de bismuto. Por outro lado, há sinergismo entre tetraciclínas e tilosina contra *Pasteurella* sp., e a associação com polimixinas

pode resultar em efeitos sinérgicos pelo fato de facilitar a sua entrada no interior da célula bacteriana. Efeito sinérgico foi também observado com a associação de doxiciclina com rifampicina ou com estreptomicina no tratamento da brucelose.

PRECAUÇÕES

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.

MARGEM DE SEGURANÇA

Dentro das dosagens recomendadas o produto é seguro para o uso por até 21 dias na dose de 5 mg de doxiciclina / kg de peso vivo a cada 12 horas, em adultos e filhotes, conforme comprovado nos estudos de segurança nas espécies-alvo (cães e gatos).

REAÇÕES ADVERSAS

As tetraciclinas (classe à qual pertence a doxiciclina) podem causar irritação tecidual. Este efeito pode provocar manifestações gastrintestinais (náuseas, vômito, diarreia) quando administradas por via oral.

Devido à capacidade que as tetraciclinas têm de se ligar ao cálcio, podem provocar efeitos cardiovasculares (arritmias), além da deposição no tecido ósseo e nos dentes.

APRESENTAÇÕES

Doxitabs 50 mg: Cartucho: 1 strip com 14 comprimidos palatáveis. Display: 5 ou 10 strips com 14 comprimidos palatáveis.

Doxitabs 100 mg: Cartucho: 1 strip com 14 comprimidos palatáveis. Display: 5 ou 10 strips com 14 comprimidos palatáveis.

Doxitabs 200 mg: Cartucho: 1 strip com 8 ou 14 comprimidos palatáveis. Display: 5 ou 10 strips com 8 ou 14 comprimidos palatáveis.

PRAZO DE VALIDADE

O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data de fabricação.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em temperatura ambiente, entre 15º C e 30º C, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte deve ser realizado conforme legislação vigente.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000885-0.000004 em 24/08/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon - CRMV - SP 36.982.

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP
CNPJ 60.411.527/0001-30
INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTES

Vansil Indústria Com. e Representações Ltda.
Rua João Augusto Cirelli, 640
13690-000 - Descalvado-SP
CNPJ 50.472.547/0001-68
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ipanema Indústria de Produtos
Veterinários Ltda.
Município de Araçoiaba da Serra
Rodovia Raposo Tavares Km 113 -SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52
INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações
sobre este medicamento usando
o código ao lado
Obrigado por nos deixar cuidar
da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br

WhatSac:
(11) 9 9545-5595

SAC:
0800 055 6642

www.biovet.com.br

biovet
vet para todos

1535-me